



Sprache: **Polnisch**

WIEK	(w tygodniach)	niemowlęta (w miesiącach)			małe dzieci		dzieci (w latach)			młodzież		dorośli			
	6	2	3	4	11-14	15-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-17	od 18	od 60		
	SZCZEPIENIE		U4		U6		U7		U7A/8		U9		U10		J1
Tężec		G1	G2	G3	G4	N	A1	N	A2	A (co 10 lat, N w razie potrzeby) ^f					
Błonica		G1	G2	G3	G4	N	A1	N	A2	A (co 10 lat, N w razie potrzeby) ^f					
Krztusiec Koklusz		G1	G2	G3	G4	N	A1	N	A2	A ^f (N w razie potrzeby)					
Nagminne porażenie dziecięce Poliomylitis		G1	G2 ^a	G3	G4	N				A1	N ^f (w razie potrzeby)				
Wirusowe zapalenie wątroby typu B		G1	G2 ^a	G3	G4	N									
Hib <i>Haemophilus influenzae</i> typu b		G1	G2 ^a	G3	G4	N									
Pneumokoki ^g		G1		G2	G3	N							S ^c		
Rotawirusy	G1 ^b	G2	(G3)												
Meningokoki Grupa serologiczna C						G1 (od 12 miesięcy)		N							
Odra						G1	G2	N					S ^d		
świnka różyczka						G1	G2	N							
Ospa wietrzna Varicella						G1	G2	N							
Grypa Influenza												S (co roku)			
HPV Wirusy brodawczaka ludzkiego								G1 ^e	G2 ^e	N ^e					

Najbliższe terminy szczepień



Gefördert durch:
 Bundesministerium für Gesundheit
 aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

OBJAŚNIENIA

G PODSTAWOWE UODPORNIENIE (w postaci do 4 szczepionek częściowych G1–G4)

S STANDARDOWE SZCZEPIENIE

A SZCZEPIENIE PRZYPOMINAJĄCE

N SZCZEPIENIE UZUPEŁNIAJĄCE (podstawowe uodpornienie wszystkich jeszcze nieszczepionych lub dokończenie niekompletnej serii szczepień)

U Badanie w celu wczesnego rozpoznania

J Badanie młodzieży (J1 w wieku od 12 do 14 lat)

^a W przypadku zastosowania szczepionki monowalentnej można zrezygnować z tej dawki.

^b Pierwsze szczepienie powinno nastąpić już w wieku 6 tygodni, w zależności od użytej szczepionki wymagane są 2 lub 3 dawki w odstępie co najmniej 4 tygodni.

^c Szczepienie jednorazowe szczepionką polisacharydową, szczepienie przypominające zalecane tylko dla określonych wskazań.

^d Jednorazowe szczepienie dla wszystkich osób urodzonych po roku 1970 ≥ 18 lat z niejasnym statusem szczepienia, bez szczepienia lub z tylko jednym szczepieniem w dzieciństwie. Szczególnie jedną szczepionką przeciwko odrze, śwince i różyczce.

^e Standardowe szczepienie dla dziewcząt w wieku 9–13 lub 9–14 lat (w zależności od zastosowanej szczepionki), liczba dawek szczepionki patrz informacja fachowa!

^f Szczepienie przypominające przeciwko tężcowi i błonicy co 10 lat. Następne przypadające szczepienie przeciwko tężcowi i błonicy jednorazowo w postaci szczepionki DTaP lub w przypadku odpowiedniego wskazania w postaci szczepionki skojarzonej IPV.

^g Wcześnieiki otrzymują dodatkową dawkę szczepionki w wieku trzech miesięcy, tzn. razem 4 dawki.