

CALENDAR PENTRU VACCINARE

Vaccinările trebuie să fie administrate cât mai timpuriu posibil.
O evaluare a stadiului vaccinărilor este importantă la orice vârstă.
Orice vaccinări care lipsesc trebuie administrate imediat, conform recomandărilor pentru grupa de vârstă respectivă.

Recomandările Comitetului German Permanent pentru vaccinare (STIKO), 2015.
www.stiko.de

ROBERT KOCH INSTITUT



Sprache: Rumänisch

VÂRSTĂ	(în săptămâni)	Nou-născuți			Sugari		Copii			Adolescenți		Adulți	
	6	2	3	4	11-14	15-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-17	de la 18	la 60
			U4		U6	U7	U7A/8	U9	U10	J1			
Tetanos		G1	G2	G3	G4	N	A1	N	A2	A (la fiecare 10 ani, f) N dacă este necesară			
Difterie		G1	G2	G3	G4	N	A1	N	A2	A (la fiecare 10 ani, f) N dacă este necesară			
Tuse convulsivă Pertussis		G1	G2	G3	G4	N	A1	N	A2	A f (N dacă este necesară)			
Polio Poliomielită		G1	G2 ^a	G3	G4	N			A1	N (dacă este necesară)			
Hepatită B		G1	G2 ^a	G3	G4	N							
Hib <i>Haemophilus influenzae de tip b</i>		G1	G2 ^a	G3	G4	N							
Pneumococcus ^g		G1		G2	G3	N						S ^c	
Rotavirusuri	G1 ^b	G2	(G3)										
Meningococcus Serogrup C					G1 (de la 12 luni)		N						
Pojar					G1	G2	N					S ^d	
Oreion Rubeolă					G1	G2	N						
Varicelă					G1	G2	N						
Gripă												S (anual)	
HPV Virusuri Papiloma uman							G1 ^e	G2 ^e	N ^e				

Datele următoarelor vaccinări



Gefördert durch:
 Bundesministerium für Gesundheit
 aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

NOTE EXPLICATIVE

- G** IMUNIZARE DE BAZĂ (în până la 4 doze de vaccin G1-G4)
- S** IMUNIZARE STANDARD
- A** IMUNIZARE DE RAPEL
- N** IMUNIZAREA PERSOANELOR NEVACCINATE ANTERIOR (imunizare de bază pentru orice persoană care nu a fost încă vaccinată sau finalizarea unei serii nefinalizate de vaccinări)
- U** Examinarea pentru recunoaștere timpurie
- J** Examinarea tinerilor (J1 cu vârsta cuprinsă între 12 și 14 ani)

- a** Această doză nu este necesară la folosirea unui vaccin monovalent.
- b** Prima vaccinare trebuie făcută deja de la vârsta de 6 săptămâni, iar în funcție de vaccinul folosit sunt necesare 2 sau 3 doze administrate la un interval de cel puțin 4 săptămâni între ele.
- c** O vaccinare singulară cu vaccin polizaharidic, imunizarea de rapel este indicată doar în cazul recomandărilor specifice.
- d** O vaccinare singulară pentru toți indivizii născuți după anul 1970 (≥ 18ani), cu un stadiu neclar al vaccinării, care nu au fost imunizați, sau cărora li s-a administrat doar un singur vaccin când erau copii. De preferat cu un vaccin MMR (antirubeolă și antipojar).

- e** Vaccinare standard la fete cu vârsta de 9-13, respectiv 9-14 ani (în funcție de vaccinul folosit). Pentru dozele de vaccin vezi informațiile de specialitate!
- f** Imunizare de rapel cu vaccin diftero-tetanic la fiecare 10 ani. Următorul vaccin diftero-tetanic (Td) necesar o singură dată ca vaccin Diftero-Tetano-Pertussis (Tdap), respectiv ca vaccin combinat Tdap-IPV (antipoliomielitic), dacă există recomandare în acest sens.
- g** Copiii prematuri primesc o doză suplimentară de vaccin la vârsta de trei luni, și anume un total de 4 doze.