

# Impfkalender 2020/2021 – Welche Impfungen sind empfohlen?

Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO), Stand August 2020

**Säuglinge und Kleinkinder**  
(2 – 23 Monate)

**Kinder und Jugendliche**  
(2 – 17 Jahre)

**Erwachsene**  
(ab 18 Jahre)

Impfungen	Säuglinge und Kleinkinder (2 – 23 Monate)						Kinder und Jugendliche (2 – 17 Jahre)						Erwachsene (ab 18 Jahre)									
	6 Wochen	U4 2	U4 3	U4 4	U5 5–10	U6 11*	U6 12	13–14	15	U7 16–23	U7a/U8 2–4	U9 5–6	U10 7–8	U11/J1 9–14	15–16	J2 17	ab 18	ab 60				
Rotaviren	G1 <sup>a</sup>		G2	G3																		
Tetanus		6-fach-Impfung	N	6-fach-Impfung	N	6-fach-Impfung	N				A1	N	A2	N			A alle 10 Jahre					
Diphtherie							N			N				A1	N	A2	N			A alle 10 Jahre		
Keuchhusten (Pertussis)							N			N				A1	N	A2	N			A <sup>e</sup>	N	
Hib (Haemophilus influenzae Typ b)												N										
Kinderlähmung (Poliomyelitis)												N						A	N			
Hepatitis B												N										
Pneumokokken		G1 <sup>b</sup>	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>	N											S <sup>g</sup>				
Meningokokken C							G1	N														
Masern						3-fach-Impfung MMR	N		G2	N								S <sup>f</sup>				
Mumps							N			N												
Röteln							N			N												
Windpocken (Varizellen)							N			N												
HPV (Humane Papillomviren)													G1 <sup>d</sup> +G2 <sup>d</sup>	N								
Gürtelrose (Herpes Zoster)																		G1 <sup>h</sup> +G2 <sup>h</sup>				
Grippe (Influenza)																		S jährlich				

Personen ab 6 Monate mit chronischen Erkrankungen (jährlich) und für Schwangere

- U** Impftermin bei Früherkennungsuntersuchung Kinder
- J** Impftermin bei Früherkennungsuntersuchung Jugendliche
- G** Grundimmunisierung (bis zu drei Teilimpfungen G1–G3)
- N** Nachholimpfung (bei unvollständigem Impfschutz)
- S** Standardimpfung
- A** Auffrischimpfung

- a** die 1. Impfung möglichst ab dem Alter von 6 Wochen, je nach Impfstoff 2 bzw. 3 Schluckimpfungen (G2/G3) mit einem Mindestabstand von 4 Wochen
  - b** Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfung im Alter von 3 Monaten (insgesamt 4 Impfungen)
  - c** Mindestabstand zur vorangegangenen Impfung 6 Monate
  - d** 2 Impfungen (im Abstand von mindestens 5 Monaten) für Mädchen und Jungen im Alter von 9–14 Jahren; bei Nachholen der Impfung beginnend im Alter > 14 Jahre sind 3 Impfungen erforderlich
  - e** einmalige Auffrischung; möglichst mit der nächsten Impfung gegen Tetanus/Diphtherie/ggf. Poliomyelitis
  - f** einmalige Impfung für alle nach 1970 Geborene mit unklarem Impfschutz, ohne Impfung oder nur einer Impfung in der Kindheit
  - g** Impfung mit sogenanntem Polysaccharid-Impfstoff
  - h** zweimalige Impfung mit dem Totimpfstoff im Abstand von mindestens 2 und maximal 6 Monaten
- \* Impfungen können auf mehrere Impftermine verteilt werden. MMR und Windpocken können am selben Termin oder in 4-wöchigem Abstand gegeben werden