

# Impfkalender 2022 – Welche Impfungen sind empfohlen?

Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO), Stand Januar 2022



**Säuglinge und Kleinkinder**  
(2 – 23 Monate)



**Kinder und Jugendliche**  
(2 – 17 Jahre)



**Erwachsene**  
(ab 18 Jahre)

Impfungen	Säuglinge und Kleinkinder (2 – 23 Monate)						Kinder und Jugendliche (2 – 17 Jahre)								Erwachsene (ab 18 Jahre)			
	6 Wochen	U4 2	U4 3	U4 4	U5 5-10	U6 11*	U6 12	13-14	15	U7 16-23	U7a/U8 2-4	U9 5-6	U10 7-8	U11/J1 9-14	15-16	J2 17	ab 18	ab 60
Rotaviren	G1 <sup>a</sup>		G2	(G3)														
Tetanus		6-fach-Impfung	N	6-fach-Impfung	N	6-fach-Impfung	N				A1	N	A2	N			A alle 10 Jahre	
Diphtherie							N					A1	N	A2	N		A alle 10 Jahre	
Keuchhusten (Pertussis)							N					A1	N	A2	N		A3 <sup>e</sup>	N
Hib (Haemophilus influenzae Typ b)																		
Kinderlähmung (Poliomyelitis)							N						A	N				
Hepatitis B							N											
Pneumokokken		G1 <sup>b</sup>	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>	N										S <sup>g</sup>	
Meningokokken C							G1	N										
Masern						3-fach-Impfung MMR	N		G2	N							S <sup>f</sup>	
Mumps							N											
Röteln							N											
Windpocken (Varizellen)						G1	N		G2	N								
HPV (Humane Papillomviren)													G1 <sup>d</sup> +G2 <sup>d</sup>	N				
Gürtelrose (Herpes Zoster)																		G1 <sup>h</sup> +G2 <sup>h</sup>
Grippe (Influenza)																		S jährlich

Personen ab 6 Monate mit chronischen Erkrankungen (jährlich) und für Schwangere

**J** Impftermin bei Früherkennungsuntersuchung Jugendliche

**U** Impftermin bei Früherkennungsuntersuchung Kinder

**N** Nachholimpfung (bei unvollständigem Impfschutz)

**A** Auffrischimpfung

**G** Grundimmunisierung (bis zu vier Teilimpfungen G1-G4)

**S** Standardimpfung

**a** die 1. Impfung möglichst ab dem Alter von 6 Wochen, je nach Impfstoff 2 bzw. 3 Schluckimpfungen (G2/G3) mit einem Mindestabstand von 4 Wochen

**b** Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfung im Alter von 3 Monaten (insgesamt 4 Impfungen)

**c** Mindestabstand zur vorangegangenen Impfung: 6 Monate

**d** 2 Impfungen (im Abstand von mindestens 5 Monaten) für Mädchen und Jungen im Alter von 9 bis 14 Jahren; bei Nachholen der Impfung beginnend im Alter ≥ 15 Jahre oder bei einem Abstand von weniger als 5 Monaten zwischen den beiden Impfungen ist eine dritte Impfung erforderlich

**e** einmalige Auffrischung; möglichst mit der nächsten Impfung gegen Tetanus/Diphtherie/ggf. Poliomyelitis

**f** einmalige Impfung für alle nach 1970 geborene Erwachsene mit unklarem Impfschutz, ohne Impfung oder nur einer Impfung in der Kindheit

**g** Impfung mit sogenanntem Polysaccharid-Impfstoff

**h** zweimalige Impfung mit dem Totimpfstoff im Abstand von mindestens 2 und maximal 6 Monaten

\* Impfungen können auf mehrere Impftermine verteilt werden. MMR und Windpocken können am selben Termin oder in 4-wöchigem Abstand gegeben werden.



**Aktuelle Informationen zur Corona-Schutzimpfung finden Sie auf unserer Seite [infektionsschutz.de](https://www.infektionsschutz.de)**