

Impfkalender 2023 – Welche Impfungen sind empfohlen?

Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO), Stand Januar 2023



Säuglinge und Kleinkinder
(2 – 23 Monate)



Kinder und Jugendliche
(2 – 17 Jahre)



Erwachsene
(ab 18 Jahre)

Impfungen	6 Wochen	U4 2	U4 3	4	U5 5-10	U6 11*	U6 12	13-14	15	U7 16-23	U7a/U8 2-4	U9 5-6	U10 7-8	U11/J1 9-14	15-16	J2 17	ab 18	ab 60
Rotaviren	G1 ^a		G2	(G3)														
Tetanus		G1 ^b		G2		G3 ^c	N				A1	N	A2	N		N	A alle 10 Jahre	
Diphtherie		G1 ^b	N	G2		G3 ^c	N				A1	N	A2	N		N	A alle 10 Jahre	
Keuchhusten (Pertussis)		G1 ^b	N	G2		G3 ^c	N				A1	N	A2	N		N	A3 ^e	N
Hib (Haemophilus influenzae Typ b)		G1 ^b	N	G2		G3 ^c	N											
Kinderlähmung (Poliomyelitis)		G1 ^b	N	G2		G3 ^c	N							A		N		
Hepatitis B		G1 ^b	N	G2		G3 ^c	N											
Pneumokokken		G1 ^b	N	G2		G3 ^c	N											S ^g
Meningokokken C							G1	N										
Masern						G1	N		G2	N								S ^f
Mumps						G1	N		G2	N								
Röteln						G1	N		G2	N								
Windpocken (Varizellen)						G1	N		G2	N								
HPV (Humane Papillomviren)													G1 ^d +G2 ^d	N				
Gürtelrose (Herpes Zoster)																		G1 ^h +G2 ^h
Grippe (Influenza)																		S jährlich

Personen ab 6 Monate mit chronischen Erkrankungen (jährlich) und für Schwangere

J Impftermin bei Früherkennungsuntersuchung Jugendliche

U Impftermin bei Früherkennungsuntersuchung Kinder

N Nachholimpfung (bei unvollständigem Impfschutz)

A Auffrischimpfung

G Grundimmunisierung (bis zu vier Teilimpfungen G1-G4)

S Standardimpfung

a die 1. Impfung möglichst ab dem Alter von 6 Wochen, je nach Impfstoff 2 bzw. 3 Schluckimpfungen (G2/G3) mit einem Mindestabstand von 4 Wochen

b Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfung im Alter von 3 Monaten (insgesamt 4 Impfungen)

c Mindestabstand zur vorangegangenen Impfung: 6 Monate

d 2 Impfungen (im Abstand von mindestens 5 Monaten) für Mädchen und Jungen im Alter von 9 bis 14 Jahren; bei Nachholen der Impfung beginnend im Alter ≥ 15 Jahre oder bei einem Abstand von weniger als 5 Monaten zwischen den beiden Impfungen ist eine dritte Impfung erforderlich

e einmalige Auffrischung; möglichst mit der nächsten Impfung gegen Tetanus/Diphtherie/ggf. Poliomyelitis

f einmalige Impfung für alle nach 1970 geborene Erwachsene mit unklarem Impfschutz, ohne Impfung oder nur einer Impfung in der Kindheit

g Impfung mit sogenanntem Polysaccharid-Impfstoff

h zweimalige Impfung mit dem Totimpfstoff im Abstand von mindestens 2 und maximal 6 Monaten

* Impfungen können auf mehrere Impftermine verteilt werden. MMR und Windpocken können am selben Termin oder in 4-wöchigem Abstand gegeben werden.



Aktuelle Informationen zur Corona-Schutzimpfung finden Sie auf unserer Seite [infektionsschutz.de](https://www.infektionsschutz.de)