



Sprache: **Kroatisch**

DOB \ CJEPIVO	(u tjednima)	Dojenčad (po mjesecima)			Mala djeca		Veća djeca (po godinama)			Mladež		Odrasli		
	6	2	3	4	11-14	15-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-17	od 18	od 60	
			U4		U6	U7	U7A/8	U9	U10	J1				
Tetanus		G1	G2	G3	G4	N	A1	N	A2	A (svakih 10 godina, f) N po potrebi				
Difterija		G1	G2	G3	G4	N	A1	N	A2	A (svakih 10 godina, f) N po potrebi				
Hripavac Pertussis		G1	G2	G3	G4	N	A1	N	A2	A (f) (N po potrebi)				
Dječja paraliza Poliomyelitis		G1	G2 <sup>a</sup>	G3	G4	N				A1	N (po potrebi)			
Hepatitis B		G1	G2 <sup>a</sup>	G3	G4	N								
Hib Haemophilus influenzae tip b		G1	G2 <sup>a</sup>	G3	G4	N								
Pneumokokna infekcija <sup>g</sup>		G1		G2	G3	N			S <sup>c</sup>					
Rotavirusi	G1 <sup>b</sup>	G2	(G3)											
Meningokokna infekcija Serološka grupa C					G1 (od 12 mjeseci)		N							
Ospice					G1	G2	N			S <sup>d</sup>				
Zaušnjaci Crvenka					G1	G2	N							
Vodne kozice Varicella					G1	G2	N							
Gripa Influenza											S (godišnje)			
HPV Čovječji papilloma virus							G1 <sup>e</sup>	G2 <sup>e</sup>	N <sup>e</sup>					

### Datumi narednih cijepljenja

---



---



---



---



---



---



Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses  
des Deutschen Bundestages

### OBRAZLOŽENJA

- G** BAZNA IMUNIZACIJA (do 4 doze G1–G4 cjepiva)
- S** STANDARDNO CIJEPLJENJE
- A** PONOVRNO CIJEPLJENJE – BUSTER DOZA
- N** NADOKNADA CIJEPLJENJA (bazna imunizacija svih koji dosad nisu bili cijepljeni ili dopuna necjelovite serije cijepljenja)
- U** Pregled za rano otkrivanje
- J** Pregled mladeži (J1 u dobi od 12–14 godina)

- a** Ova doza nije potrebna prilikom uporabe monovalentnog cjepiva.
- b** Prvo cijepljenje trebalo bi uslijediti već od 6. tjedna života, a ovisno o korištenom cjepivu potrebne su 2 odnosno 3 doze u razmaku od najmanje 4 tjedana.
- c** Jednokratno cijepljenje polisaharidnim cjepivom, docjepljivanje se preporuča samo kod određenih indikacija.
- d** Jednokratno cijepljenje svih punoljetnih osoba koje su rođene nakon 1970. godine, koje nisu nijednom ili su samo jednom cijepljene u djetinjstvu ili za koje se ne zna točno stanje procijepljenosti. Preferira se MMR cjepivo.
- e** Standardna vakcinacija za djevojčice od 9–13 ili 9–14 godina (ovisno od korištene vakcine); za ukupan broj doza za vakcinaciju pogledajte stručne informacije!
- f** Td docjepljivanje svakih 10 godina. Sljedeće potrebno Td cijepljenje jednokratno kao Tdap ili u slučaju odgovarajuće indikacije kombiniranim cjepivom Tdap-IPV.
- g** Nedonoščad prima jednu dodatnu dozu cjepiva u dobi od tri mjeseca, dakle ukupno 4 doze.